




آمبولی ریه

گروه هدف: بیمار و همراهان



تئیه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز
با تایید دکتر بدیع الزمان رادپی

(متخصص بیهوشی، مراقبت های ویژه و دردشناسی)

بازبینی زمستان ۱۴۰۱

راههای به حداقل رساندن خطر خونریزی زمانی که با ضد اتفاقات درمان می شوید:

- استفاده از ریش تراش برقی به جای تیغ - نخ دندان و مسواک نرم
- اجتناب از گذاشتن مواد تیز در دهان مانند خلال دندان
- با پای برهنه قدم نزنید.
- ناخن ها را به دقت بچینید.
- از موقعیت هایی که موجب آسیب می شود اجتناب کنید مانند ورزش های تماسی
- با فشار فین نکنید.
- از زور زدن هنگام دفع مدفوع خود داری کنید.
- علائمی که باید فوراً به پزشک اطلاع داد**
- حساسیت، ورم و یا درد اندام تحتانی
- درد ناگهانی قفسه سینه
- کوتاهی نفسها و یا افزایش در تعداد آن
- تشدید اضطراب یا بی قراری
- سرفه همراه با خلط خونی یا رگه های خون در خلط
- خونریزی غیر معمول
- تب.

منبع:

کتاب پرستاری برونر- سودارت ۲۰۲۲

✓ اجتناب از نشستن یا ایستادن در یک وضعیت برای مدت طولانی

✓ زمانی که ناگزیر از نشستن طولانی مدت هستید مانند سفر با هواپیما یا خودرو ، هر چند وقت یکبار قدم بزنید یا حداقل انگشتان پا را خم و راست کرده و پاهای خود را حرکت دهید.

✓ اجتناب از روی هم انداختن پاهای و دراز کشیدن یا نشستن با قرار دادن چند بالش زیر زانوها تمرينات منظم مانند شنا

✓ قدم زدن - دو چرخه سواری - بالا بردن پاهای به طور دوره ای به خصوص زمانی که می نشینید.

✓ حفظ وزن ایده آل بدن نسبت به سن، قد و استخوان بندی

✓ سیگار کشیدن و استفاده از استروژن یا قرص های جلوگیری از حاملگی خطر تشکیل ترومبوز مجدد را افزایش می دهد .

✓ مصرف دارو طبق دستور پزشک که بسیار مهم است.

✓ سایر داروهای تجویز شده بدون نسخه ای را که مصرف می کنید به پزشک اطلاع دهید .

درمان

پزشک شما داروهای ضد انعقاد را برای پیشگیری از ایجاد لخته های بیشتر یا بزرگتر شدن لخته موجود تجویز می کند. در ابتدا به صورت داخل سیاهرگی تجویز می شود که اغلب همراه با آن وارفارین خوراکی نیز داده می شود.

راههای کاهش خطر تشکیل مجدد ترومبوуз و آمبولی ریوی


- ✓ پس از هر نوع جراحی ، برای پیشگیری از تشکیل لخته ، پزشک شما را تشویق می کند که در اولین فرصت ممکن از جا بر خاسته و قدم بزنید و یا خودتان و یا فرد دیگری ، اندام های تحتانی شما را ورزش دهد.
- ✓ اگر قادر به حرکت نیستید اندام های تحتانی خود را بالا قرار دهید و جوراب واریس پوشید.
- ✓ اجتناب از پوشیدن لباس تنگ مانند کمربند ، جوراب خیلی تنگ

آمبولی ریه چه خطری دارد؟

آمبولی ریه در ۱۰ درصد از بیماران ، در عرض چند ساعت منجر به مرگ می شود اگر فرد زنده بماند و تحت تشخیص و درمان صحیح قرار گیرد ، پیامد آن خوب خواهد بود و در صورت نداشتن بیماری جدی ، در عرض تنها چند هفته به سلامت طبیعی باز می گردد.

عوامل خطر

عمل جراحی ، بستری شدن طولانی مدت یا عدم تحرک ، سکته مغزی ، حمله قلبی ، چاقی و شکستگی لگن یا استخوان ران خطر آمبولی ریه را افزایش می دهد.



آمبولی

واژه آمبولی به معنی انسداد شریان به وسیله یک جسم متحرک است . این جسم متحرک به طور معمول یک لخته خون است ، اما گاهی اوقات یک توده چربی ، یک حباب هوا ، تکه ای از یک تومور یا دسته ای از باکتری ها است . این جسم متحرک به یک رگ خونی واقع در ریه وارد شده ، در آنجا گیر افتاده و مانع از جریان خون می شود.

علائم نشانه های آمبولی چیست؟

-تنگی نفس ناگهانی

-اضطراب

-سرفه تولید کننده خلط خونی یا حاوی رگ های خون

-تعریق شدید

-افزايش ضربان قلب

دقت کنید که علائم و نشانه های ناشی از انسداد ، به اندازه جسم متحرک و سلامت دستگاه قلبی - ریوی بستگی دارد .