



**برنامه های پیگیری و
راهنمایی بیماران
محترم که تحت عمل
جراحی یورتروپلاستی
قرار گرفته اند**

تلفن تماس: ۹-۲۲۷۱۸۰۰۰ داخلی ۲۸۶

تلفن مستقیم بخش تصویربرداری: ۲۲۷۰۱۶۲۸

تهیه کننده: گروه آموزش به بیمار
بازبینی زمستان ۱۴۰۱



**برنامه های پیگیری و
راهنمایی بیماران
محترم که تحت عمل
جراحی یورتروپلاستی
قرار گرفته اند**

تلفن تماس: ۹-۲۲۷۱۸۰۰۰ داخلی ۲۸۶

تلفن مستقیم بخش تصویربرداری: ۲۲۷۰۱۶۲۸

تهیه کننده: گروه آموزش به بیمار
بازبینی زمستان ۱۴۰۱



**برنامه های پیگیری و
راهنمایی بیماران
محترم که تحت عمل
جراحی یورتروپلاستی
قرار گرفته اند**

تلفن تماس: ۹-۲۲۷۱۸۰۰۰ داخلی ۲۸۶

تلفن مستقیم بخش تصویربرداری: ۲۲۷۰۱۶۲۸

تهیه کننده: گروه آموزش به بیمار
بازبینی زمستان ۱۴۰۱

۱- بیماران لازم است به مدت یک هفته بعد از عمل جراحی آنتی بیوتیک تزریقی (سه نوع دارو) دریافت کنند و پس از آن نیز به مدت دو هفته داروی خوراکی مصرف نمایند.

۲- از بخش رادیولوژی نوبت وقت گرافی از مجرا جهت ۲۱ روز بعد از عمل جراحی هنگام ترخیص گرفته شود و روز ۲۱ بعد از عمل جراحی جهت انجام گرافی و ویزیت به این مرکز مراجعه شود.

۳- طی مدت حضور در منزل پس از ترخیص، در صورت هرگونه تب بالا، عفونت زخم و یا هرگونه مشکلی با این مرکز که شبانه روزی می باشد تماس حاصل نمایید.

۴- در منزل استراحت نسبی داشته و مایعات فراوان بنوشید و غذاهای مقوی مصرف نمایید.

۵- در صورت خارج شدن سوند مجرا زودتر از موعد، سریعاً به این مرکز به طور اورژانس مراجعه نمایید.

۶- بخیه های محل عمل همگی قابل جذب بوده و طی ۳ تا ۴ هفته بعد از عمل به تدریج خودبخود جذب خواهند شد.

۷- بیماران می توانند طی مدت نقاهت در منزل، استحمام به طور معمول داشته باشند.

۸- پس از کشیدن سوند (بعد از ۲۱ روز) بیماران اورتروپلاستی به مدت طولانی تحت نظر بخش خواهند بود.

۱- بیماران لازم است به مدت یک هفته بعد از عمل جراحی آنتی بیوتیک تزریقی (سه نوع دارو) دریافت کنند و پس از آن نیز به مدت دو هفته داروی خوراکی مصرف نمایند.

۲- از بخش رادیولوژی نوبت وقت گرافی از مجرا جهت ۲۱ روز بعد از عمل جراحی هنگام ترخیص گرفته شود و روز ۲۱ بعد از عمل جراحی جهت انجام گرافی و ویزیت به این مرکز مراجعه شود.

۳- طی مدت حضور در منزل پس از ترخیص، در صورت هرگونه تب بالا، عفونت زخم و یا هرگونه مشکلی با این مرکز که شبانه روزی می باشد تماس حاصل نمایید.

۴- در منزل استراحت نسبی داشته و مایعات فراوان بنوشید و غذاهای مقوی مصرف نمایید.

۵- در صورت خارج شدن سوند مجرا زودتر از موعد، سریعاً به این مرکز به طور اورژانس مراجعه نمایید.

۶- بخیه های محل عمل همگی قابل جذب بوده و طی ۳ تا ۴ هفته بعد از عمل به تدریج خودبخود جذب خواهند شد.

۷- بیماران می توانند طی مدت نقاهت در منزل، استحمام به طور معمول داشته باشند.

۸- پس از کشیدن سوند (بعد از ۲۱ روز) بیماران اورتروپلاستی به مدت طولانی تحت نظر بخش خواهند بود.

۱- بیماران لازم است به مدت یک هفته بعد از عمل جراحی آنتی بیوتیک تزریقی (سه نوع دارو) دریافت کنند و پس از آن نیز به مدت دو هفته داروی خوراکی مصرف نمایند.

۲- از بخش رادیولوژی نوبت وقت گرافی از مجرا جهت ۲۱ روز بعد از عمل جراحی هنگام ترخیص گرفته شود و روز ۲۱ بعد از عمل جراحی جهت انجام گرافی و ویزیت به این مرکز مراجعه شود.

۳- طی مدت حضور در منزل پس از ترخیص، در صورت هرگونه تب بالا، عفونت زخم و یا هرگونه مشکلی با این مرکز که شبانه روزی می باشد تماس حاصل نمایید.

۴- در منزل استراحت نسبی داشته و مایعات فراوان بنوشید و غذاهای مقوی مصرف نمایید.

۵- در صورت خارج شدن سوند مجرا زودتر از موعد، سریعاً به این مرکز به طور اورژانس مراجعه نمایید.

۶- بخیه های محل عمل همگی قابل جذب بوده و طی ۳ تا ۴ هفته بعد از عمل به تدریج خودبخود جذب خواهند شد.

۷- بیماران می توانند طی مدت نقاهت در منزل، استحمام به طور معمول داشته باشند.

۸- پس از کشیدن سوند (بعد از ۲۱ روز) بیماران اورتروپلاستی به مدت طولانی تحت نظر بخش خواهند بود.