



آمادگی قبل از انجام آمبولیزاسیون

گروه هدف: تمام گروه های سنی

تلفن تماس: ۹-۲۲۷۱۸۰۰۰

تلفن مستقیم بخش تصویربرداری: ۲۲۷۰۱۶۲۸

تهیه کننده: گروه آموزش به بیمار
بازبینی زمستان ۱۴۰۱



آمادگی قبل از انجام آمبولیزاسیون

گروه هدف: تمام گروه های سنی

تلفن تماس: ۹-۲۲۷۱۸۰۰۰

تلفن مستقیم بخش تصویربرداری: ۲۲۷۰۱۶۲۸

تهیه کننده: گروه آموزش به بیمار
بازبینی زمستان ۱۴۰۱



آمادگی قبل از انجام آمبولیزاسیون

گروه هدف: تمام گروه های سنی

تلفن تماس: ۹-۲۲۷۱۸۰۰۰

تلفن مستقیم بخش تصویربرداری: ۲۲۷۰۱۶۲۸

تهیه کننده: گروه آموزش به بیمار
بازبینی زمستان ۱۴۰۱

آمادگی های لازم جهت انجام آمبولیزاسیون:

- ۱- بیمار شب قبل از آمبولیزاسیون شام سبک میل نماید و از ۱۲ شب ناشتا باشد. (۶ ساعت قبل از آمبولیزاسیون).
- ۲- جواب PT, PTT, INR و CBC به صورت کتبی در پرونده موجود باشد.
- ۳- بیمار حتماً با پرستار یا کمک بهیار به آمبولیزاسیون اعزام شود.
- ۴- در صورت نیاز طبق نظر رادیولوژیست مشاوره بی هوشی باید انجام شود. بیماران بالای ۴۰ سال مشاوره قلب نیاز دارند.
- ۵- رضایت نامه کتبی از بستگان درجه یک بیمار در پرونده الزامی است و هیچ همراهی به بخش اینترونشن فرستاده نشود.
- ۶- بیمار پس از ویزیت و مشخص شدن نوع و زمان آمبولیزاسیون به بخش منتقل می شود.
- ۷- هپارین ۸ ساعت قبل، وارفارین ۳روز قبل، آسپرین ۵ روز قبل، متفورمین یک روز قبل قطع شود.
- ۸- شیو شکم و کشاله ران انجام شود. کیسه شن با بیمار به آمبولیزاسیون آورده شود.
- ۹- در زمان انجام آمبولیزاسیون بیمار گان پوشیده و با IV Line و کلیه مدارک و سوابق پزشکی و نتیجه آزمایشات از بخش تحویل گرفته می شود.
- ۱۰- درخواست مشاوره آمبولیزاسیون به همراه کد پذیرش به بخش اینترونشن ارسال شود.
- ۱۱- بعد از انجام آمبولیزاسیون حضور پرستار هنگام تحویل به بخش الزامی است.
- ۱۲- کیسه شن و ظرف نمونه نرمال سالین و کیسه یخ همراه بیمار به بخش اینترونشن فرستاده شود.

آمادگی های لازم جهت انجام آمبولیزاسیون :

- ۱- بیمار شب قبل از آمبولیزاسیون شام سبک میل نماید و از ۱۲ شب ناشتا باشد. (۶ ساعت قبل از آمبولیزاسیون).
- ۲- جواب PT, PTT, INR و CBC به صورت کتبی در پرونده موجود باشد.
- ۳- بیمار حتماً با پرستار یا کمک بهیار به آمبولیزاسیون اعزام شود.
- ۴- در صورت نیاز طبق نظر رادیولوژیست مشاوره بی هوشی باید انجام شود. بیماران بالای ۴۰ سال مشاوره قلب نیاز دارند.
- ۵- رضایت نامه کتبی از بستگان درجه یک بیمار در پرونده الزامی است و هیچ همراهی به بخش اینترونشن فرستاده نشود.
- ۶- بیمار پس از ویزیت و مشخص شدن نوع و زمان آمبولیزاسیون به بخش منتقل می شود.
- ۷- هپارین ۸ ساعت قبل، وارفارین ۳روز قبل، آسپرین ۵ روز قبل، متفورمین یک روز قبل قطع شود.
- ۸- شیو شکم و کشاله ران انجام شود. کیسه شن با بیمار به آمبولیزاسیون آورده شود.
- ۹- در زمان انجام آمبولیزاسیون بیمار گان پوشیده و با IV Line و کلیه مدارک و سوابق پزشکی و نتیجه آزمایشات از بخش تحویل گرفته می شود.
- ۱۰- درخواست مشاوره آمبولیزاسیون به همراه کد پذیرش به بخش اینترونشن ارسال شود.
- ۱۱- بعد از انجام آمبولیزاسیون حضور پرستار هنگام تحویل به بخش الزامی است.
- ۱۲- کیسه شن و ظرف نمونه نرمال سالین و کیسه یخ همراه بیمار به بخش اینترونشن فرستاده شود.

آمادگی های لازم جهت انجام آمبولیزاسیون :

- ۱- بیمار شب قبل از آمبولیزاسیون شام سبک میل نماید و از ۱۲ شب ناشتا باشد. (۶ ساعت قبل از آمبولیزاسیون).
- ۲- جواب PT, PTT, INR و CBC به صورت کتبی در پرونده موجود باشد.
- ۳- بیمار حتماً با پرستار یا کمک بهیار به آمبولیزاسیون اعزام شود.
- ۴- در صورت نیاز طبق نظر رادیولوژیست مشاوره بی هوشی باید انجام شود. بیماران بالای ۴۰ سال مشاوره قلب نیاز دارند.
- ۵- رضایت نامه کتبی از بستگان درجه یک بیمار در پرونده الزامی است و هیچ همراهی به بخش اینترونشن فرستاده نشود.
- ۶- بیمار پس از ویزیت و مشخص شدن نوع و زمان آمبولیزاسیون به بخش منتقل می شود.
- ۷- هپارین ۸ ساعت قبل، وارفارین ۳روز قبل، آسپرین ۵ روز قبل، متفورمین یک روز قبل قطع شود.
- ۸- شیو شکم و کشاله ران انجام شود. کیسه شن با بیمار به آمبولیزاسیون آورده شود.
- ۹- در زمان انجام آمبولیزاسیون بیمار گان پوشیده و با IV Line و کلیه مدارک و سوابق پزشکی و نتیجه آزمایشات از بخش تحویل گرفته می شود.
- ۱۰- درخواست مشاوره آمبولیزاسیون به همراه کد پذیرش به بخش اینترونشن ارسال شود.
- ۱۱- بعد از انجام آمبولیزاسیون حضور پرستار هنگام تحویل به بخش الزامی است.
- ۱۲- کیسه شن و ظرف نمونه نرمال سالین و کیسه یخ همراه بیمار به بخش اینترونشن فرستاده شود.