



برونکوسکوپي

گروه هدف: مراجعین



تهیه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز

با تأیید: سرکار خانم دکتر راما بزرگمهر (فوق تخصص ریه)

بازبینی زمستان ۱۴۰۱

۷- در صورت بروز سرفه با دفع ترشحات خونی بیش از ۲ تا ۳ سی سی ، مشکل در نفس کشیدن، خس خس و درد قفسه سینه فوراً به پزشک اطلاع داده شود.
۸- ممکن است تب تا ۲۴ ساعت پس از برونکوسکوپي ادامه داشته باشد.

منبع:

1- Impact of anesthetic technique in endobronchial Ultrasound bronchoscopy, Dimitris flintras 2017

۵- بیمار باید سعی کند آرامش خود را حفظ نماید.
۶- در انتهای کار زمانی که پزشک معاینه دستگاه تنفسی را تکمیل کرد، برونکوسکوپ را خارج خواهد ساخت.

پس از آزمون:


- ۱- برای احساس راحتی بیمار زیر سر بیمار بالا آورده می شود.
- ۲- یک تا دو ساعت بعد از انجام برونکوسکوپي به دقت کنترل خواهد شد.
- ۳- تا زمان از بین رفتن اثرات بی حسی (۲-۱ ساعت)، اجازه خوردن و آشامیدن یا مصرف دارو ، به بیمار داده نمی شود.
- ۴- گاهی ممکن است بیمار به طور موقت دچار گرفتگی صدا یا گلو درد شود که این عارضه موقت بوده و کم کم برطرف می شود.
- ۵- بلا فاصله بعد از آزمون ممکن است یک عکس از قفسه سینه بیمار گرفته شود.
- ۶- به مدت ۶-۸ ساعت بعد از برونکوسکوپي از مصرف دخانیات پرهیز شود. زیرا باعث تحریک سرفه و خونریزی می شود.

حین انجام برونکوسکوپی:

- ۱- مدت زمان انجام این آزمون ۶۰-۳۰ دقیقه است. بیمار با راهنمایی پرستار مسئول، روی تخت دراز می کشد.
- ۲- برونکوسکوپ از طریق دهان یا بینی به داخل مجرای تنفسی هدایت می شود. جهت کاهش سرفه و خس خس، یک بی حس کننده در دهان بیمار اسپری می شود و برای کنترل سلامتی در حین کار یک حسگر به انگشتان بیمار وصل می گردد تا ضربان قلب و اکسیژن بدن نمایش داده شود.
- ۳- در صورت نیاز، نمونه حاصل از شستشوی ریه جمع آوری و به آزمایشگاه ارسال می گردد.
- ۴- زمانی که برونکوسکوپ از طریق دهان وارد می شود، دم و بازدم باید از طریق بینی و با دهان باز انجام شود.

۴- رادیوگرافی های خود را بیاورید.

۵- بلافاصله قبل از آزمون برای بی حسی گلو و آرامش بیمار از بی حس کننده ها و آرام بخش ها استفاده می شود که این کار به پیشرفت برونکوسکوپ در داخل تراشه کمک می کند.



برونکوسکوپی یکی از اقدامات درمانی می باشد. این آزمون امکان معاینه مجاری تنفسی (حنجره، تراشه، برونش) توسط یک وسیله کوچک و باریک و لوله مانند که دوربین کوچکی در انتهای آن نصب شده است را فراهم می سازد، پزشک می تواند از این طریق، هر گونه تنگی یا اختلال در مجرای تنفسی را مشاهده نماید که به تشخیص بیماری کمک خواهد کرد، یا از بافت مجرای تنفسی نمونه برداری کند و اجسام خارجی یا ترشحات موجود در مجرای تنفسی را خارج نماید و جراحی های کوچکی انجام دهد.

قبل از آزمون:

- ۱- از هشت ساعت قبل از آزمون ناشتا باشید. از ۲۴ ساعت قبل نیز از نوشیدن مایعات الکلی اجتناب کنید.
 - ۲- دندانهای مصنوعی، لنزهای تماسی و جواهرات خود را خارج کنید.
 - ۳- داروهای تجویز شده را طبق نظر پزشک خود مصرف کنید (چنانچه داروهای فشار خون، دیابت، تشنج، آسپرین و داروهای قلبی یا وارفارین استفاده می کنید، حتما به پزشک خود اطلاع دهید).
- بهتر است ۷۲ ساعت قبل از برونکوسکوپی با نظر پزشک داروهایی مانند وارفارین و آسپرین قطع گردد.