

## خودمراقبتی در شیر دادن

گروه هدف : مادران شیر ده



تهیه کنندگان : گروه آموزش به بیمار مرکز

با تایید دکتر علی اصغر حلیمی اصل(متخصص اطفال)

بازبینی زمستان ۱۴۰۱



- در طول ماه اول شیردهی بعضی از مادران به دلیل تغییرات هورمونی بعد از زایمان اظهار می دارند پستانهایشان نرم تر شده است . این امر طبیعی است و نباید فکر کنند که شیرشان کم شده است .
- یک شیرخوار سالم خودبرنمه تغذیه اش را تنظیم می کند ولی در مورد نوزادان نارس یا بیمار ممکن است لازم باشد نوزاد را به طور منظم جهت شیرخوردن بیدار کرد.
- مقدار تولید شیر مادر به دفعات مکرر تغذیه شیرخوار و مکیدن صحیح و موثر و تخلیه کامل پستان بستگی دارد.
- دادن شیرخشک، آب قند، داروهای گیاهی، شیرخشت، ترنج‌بین، قطره بیلی فاستر و هر ماده غذایی به نوزاد در هر زمان به خصوص در چند روز اول عمر علاوه بر خطر آلوگی و ایجاد حساسیت مانع افزایش مناسب حجم شیر مادر و حتی عدم موققیت او در ادامه شیردهی شود.

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید

- آدرس سایت : پرتال بیمارستان شهداء تجریش .
- آدرس پستی: تهران-م تجریش-خ شهرداری- بیمارستان شهداء تجریش. تلفن بیمارستان : ۹-۲۲۷۱۸۰۰۱ / داخلی بخش زنان زایمان: ۳۳۵ - ۳۲۵

منبع : کتاب شیر مادر، به تهیه کنندگی انجمن ترویج تغذیه با

شیر مادر ، تابستان ۹۱

تغییر می کند . ( مکیدن های سریعتر و سطحی تر به مکیدن های آرام تر و عمیق تر تبدیل میشود ) .

- وزن نوزاد در روز دهم تا حداقل روز ۱۴ تولد به وزن تولدش می رسد .
- شیرخوار در فاصله دفعات تغذیه راضی به نظر رسیده و به مدت یک تا دو ساعت می خوابد، خودش بیدار شده و علائم گرسنگی را بروز میدهد .
- شیرخوار هوشیار و فعال است .
- پستان های مادر بعد از شیر دادن نرم تر می شود .
- به طور کلی افزایش وزن مطابق منحنی رشد، دفع ادرار و مدفوع طبق آن چه که گفته شد، ظاهر سالم، چشم های براق ، پوست شاداب با قوام و رنگ طبیعی ، هوشیاری ، فعال بودن و خواب خوب نشانه های دریافت کافی شیر مادر است.

### ترشح شیر

- مقدار شیر مادر معمولا از روز سوم تا چهارم بعد از زایمان به سرعت افزایش می یابد . در زایمان اول ممکن است این زمان ۵ الی ۶ روز باشد .
- در طول دو هفته اول عمر ، آغاز به تدریج با شیر کامل جایگزین می شود .

## راه های تشخیص کافی بودن شیر مادر

مهم است که مادر اطمینان و اعتماد به نفس لازم در مورد توانایی تغذیه فرزندش را داشته باشد . این اعتماد به نفس می تواند در تحریک، تولید و ترشح شیر او بسیار موثر باشد به علاوه در همان هفته های اول تولد هم راه هایی وجود دارد که سبب می شود مادر اطمینان خاطر پیدا کند که شیرخوارش به مقدار کافی شیر دریافت نموده است .

افزایش وزن، دفعات دفع ادرار و دفعات مدفعه بهترین نشانه های دریافت شیر است .

### الف. افزایش وزن :

معمولًا نوزادان پس از تولد، مقداری از وزن خود را از دست می دهند (آب اضافی ذخیره شده در بین سلول ها) . کاهش وزن نوزاد معمولًا ۵ درصد و حداقل تا ۷ درصد طبیعی است. کاهش وزن آگر بیش از ۵ درصد باشد باید نوزاد را قبل از این که دچار مشکل جدی شود ارزیابی نمود.

نوزادانی که به طریق زایمان طبیعی متولد شده و به طور انحصاری و به طور مکرر با شیر مادر تغذیه می شوند نسبت به نوزادانی که از طریق سزارین به دنیا

**مدفعه نوزاد** در ۳ تا ۴ روز اول غلیظ، سیاه رنگ و چسبنده است (قیری) . بعد از روز چهارم مدفعه بینابینی و به رنگ سبز متمایل به سیاه تا سبز قهوه ای شده و در طی دو تا سه روز بعد به رنگ زرد طلایی با قوام شل ولی دانه دانه تغییر می یابد .

در ماه اول زندگی معمولاً نوزاد چهار بار و یا بیشتر در روز مدفعه می کند ولی ممکن است به ازاء هر نوبت شیر خوردن یک بار دفعه مدفعه داشته باشد .

از هفته چهارم زندگی به بعد اگر دفعات دفع مدفعه حداقل سه بار یا بیشتر در روز باشد نشانه دریافت کافی شیر مادر است .

فاصله بین دفعات دفع مدفعه به تدریج افزایش می یابد به طوری که در شیرخواران بزرگتر ممکن است چندبار در روز و یا حتی هر سه یا هفت روز یک بار باشد به شرط این که فرم مدفعه طبیعی بوده و قوام سفت نداشته باشد .

### ج. سایر نشانه های کافی بودن شیر مادر

- ریتم مکیدن در طی شیر خوردن از شش بار مکیدن و یک بار قورت دادن (بلعیدن) در شروع هر نوبت شیر خوردن، به یک یا دو بار مکیدن و یک بار قورت دادن

می آیند وزن کمتری از دست می دهند و کاهش وزن آنان سریع تر جبران می شود .

به طور کلی در سه ماه اول زندگی، شیرخوار ۲۰ تا ۳۰ گرم در روز وزن می گیرد که در هر ماه حدود ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم است .

### ب. دفع ادرار و مدفعه :

به عنوان یک قانون سرانگشتی ، حداقل دفعات ادرار و مدفعه در روز اول، یک بار ادرار و یک بار مدفعه ، روز دوم دو بار ادرار و دو بار مدفعه و روز سوم سه بار ادرار و سه بار مدفعه می باشد .

ادرار نوزاد باید رقیق و زرد کم رنگ بوده و بوی تندي نداشته و کدر نباشد . خیسی پوشک باید در حد خیس شدن با ۳۰ میلی لیتر آب باشد. توصیه می شود تا دو ماهگی از پوشک های با قابلیت جذب بالا استفاده نشود زیرا مقدار واقعی ادرار را مشخص نمی کند .

از روز چهارم تولد به بعد نوزادی که فقط شیر مادر می خورد در هر ۲۴ ساعت حداقل شش کهنه را خیس می نماید.

بعد از ۶ تا ۸ هفته اول زندگی، دفعات دفع ادرار به دلیل افزایش حجم مثانه کمتر ولی حجم ادرار بیشتر