

بسمه تعالی

بیزشکی هسته ای، علم تشخیصی و درمان بسیاری از بیماری ها با استفاده از پرتوداروها می باشد. در این روش، از پرتوداروهایی استفاده می شود که مشابه ملکولهای داخل بدن هستند. بنابراین پس از تجویز پرتوداروهای ای توان به آسانی ارگانهای مختلف بدن و تغییرات ناشی از بیماریها را بررسی نمود و حتی بسیاری از بیماریها را کشف در روشهای تصویربرداری آنالوگیک مانند سی تی اسکن تشخیص داد.

بخش بیزشکی هسته ای موزک بیزشکی، آموزشی و درمانی اشده تحریش از نخستین موکز بیزشکی هسته ای در سطح کشور می باشد. در سالهای اخیر و پس از بازسازی و خرد تجهیزات به روز و پیشرفته، بسیاری از اسکنها با کیفیت بالی در این مرکز انجام می شود.

اسکن استخوان

اسکن استخوان روشنی تشخیصی است که به ارزیابی دقیق وضعیت استخوانها در بیماران مختلف می پردازد و برای تشخیص علل درد های استخوانی کمک کننده است.

نکات مهم قبل از انجام اسکن

۱. انجام این اسکن برای بانوان باردار ممنوع می باشد.
۲. انجام رادیوگرافی با مواد حاچب ۲۴ ساعت قبل از انجام اسکن ممنوع می باشد.
۳. لباس راحت و بدون دکمه با زیپ فلزی بیوشهید.
۴. نیازی نیست رور انجام اسکن ناشنا باشید.
۵. قبل از انجام اسکن مقدار زیادی آب و مایعات مصرف نمایید.
۶. تمامی مدارک بیزشکی مربوط به بیماری خود را همراه داشته باشید.
۷. اگر اسکن کلیه برای کودک شما انجام می شود، می توانید کودک خود را در اتفاق اسکن همراهی کنید و بهتر است اسباب بازی و خوارکی های مورد علاقه کودک را با خود همراه داشته باشید. در برخی موارد لازم است به کودک داروی خواب آور داده شود.

روند انجام اسکن

اسکن در زیر دوربین گاما و همزمان با تزریق انجام می شودو قبلاً از شروع اسکن باید منانه خود را تخلیه نمایید. ابتدا رُت گیری از شما انجام می شود و سپس همزمان با تزریق دارو، تصویربرداری شما شروع می شود. بنابراین باید به مدت حداقل ۴۰ دقیقه کاملاً بی حرکت بخوابید. در صورت نیاز به تزریق داروی مدر، این کار بناهی نظر پرتوشک انجام خواهد شد. گاهی اوقات لازم است تصاویر ناخوشی از بیمار تهیه شود که هو کدام از آنها ۲ تا ۵ دقیقه بطول می انجامد.

بازی و خوارکی های مورد علاقه کودک را با خود همراه داشته باشید.

روند انجام کار

جهت انجام این اسکن داروی شما بصورت ژریدی تزریق می شود و تصویربرداری ۳ تا ۴ ساعت بعد انجام خواهد شد. سپری شدن این زمان جهت تهیه تصاویر ازامی می باشد. مصرف مایعات (حداقل ۸ لیوان) و تخلیه مثانه در این فاصله زمانی منجر به تهیه تصاویر با کیفیت مناسب می گردد و در طی این مدت شما در اتفاق انتظار بسر خواهید برد. تصویربرداری ۴۵ تا ۶۰ دقیقه بطول می انجامد. در بعضی از موارد بنا بر نظر بیزشک، لازم است در حین تزریق، تصویربرداری نیز انجام شود. در این زمان تزریق در اتفاق اسکن و در زیر دوربین گاما انجام می شود. این تصویربرداری اولیه تا ۱۵ دقیقه بطول می انجامد و جهت انجام مرحله نهایی تصویربرداری گذشت ۳ تا ۴ ساعت الزامی است.

نکات مهم

۱. پس از تزریق از تردد در راهروها و نزدیک شدن به پرسنل اکیداً اجتناب کنید. در صورت نیاز به هر گونه پرسش، لطفاً توسط همراه بیمار انجام گیرد.
۲. در حین تصویربرداری بیمار باید بدون حرکت بر روی تخت قرار گیرد. هر گونه حرکت در حین تصویربرداری می تواند باعث خرابی تصویر شده و منجر به تکرار آن گردد.

نکات ایمنی پس از پایان اسکن

۱. از مواجهه با خانم های باردار و کودکان زیر ۶ سال تا ۲۴ ساعت پس از اسکن اجتناب کنید.
۲. در مورد بانوان شیر ده، تا حدود ۲۴ ساعت از شیر دادن اجتناب شود.
۳. بعد از انجام اسکن مقدار زیادی آب و مایعات مصرف نشود.



دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهداء تجریش

بخش پزشکی هسته ای

اسکن استخوان (MDP)

اسکن دینامیک کلیه (DTPA)

اسکن پارافشیم کلیه (DMSA)



نشانی: تهران - میدان تجریش - بیمارستان شهداء تجریش

شماره تماس بیمارستان: ۰۱-۹۲۷۱۸۰۰۱-۹

شماره تماس مستقیم بخش:

۰۲۷۲۳۲۶۲

Address:
Shahid-e-Tajrish Medical center - Tajrishi St.
Tehran-Iran

Ext:

۰۲۶۱۲۷۷۱۸۰۰۱-۹

Direct Tel: ۰۲۶۱۲۷۷۳۶۰۰

بروحی سوارد لازم است به کودک داروی خواب آور داده شود. عدم حرکت فرزند شما در حین تصویربرداری بسیار عهم می باشد.

روند انجام کار

در آناق بزریق داروی شما تزریق می شود. نیمیں بعد از ۲ تا ۳ ساعت اسکن شما انجام خواهد شد. سیوی شدن این سدت جهت نهیه تصاویر با کیفیت مناسب لازم می باشد. در طول زمان انتظار حداقل ۵ تا ۶ لیوان آب و یا مایر مایعات میل تعاوید و قبل از شروع تصویربرداری حتیً مانع خود را خالی کنید.

۲ تا ۴ ساعت پس از تزریق اسکن شما شروع شده و حداقل ۲۰ تا ۴۰ دقیقه بطول می انجامد. در طول مدت تصویربرداری باید کاملاً بی حرکت باشید تا نیازی به تکرار مجدد تصویربرداری نباشد. در صورت نیاز تصاویر نکملی نیز تمهیخ خواهد شد.

نکات قابل توجه پس از تزریق پرتو دارو

۱- پس از اسکن و به منظور رعایت اینمی، لازم است فاصله ۲ متر را با اطرافیان به مدت ۲۴ ساعت حفظ کنید. فاصله کمتر در زمان کوتاه عانع ندارد.

۲- لازم است طی ۲۴ ساعت پس از پایان اسکن، از نمایش نزدیک با خانم های باردار و کودکان زیر ۶ سال یوهیز کنید.

۳- در صورتیکه به کودک خود شیر می دهید لازم است تا ۱۲ ساعت پس از اسکن از شیر دهی کودک اجتناب کنید و شیر خود را دوشیده و دور بریزید.

۴- بعد از انجام اسکن عقدار زیادی آب و مایعات مصرف شود.

۵- پس از تزریق، از تردد در راهروها و نزدیک شدن به پرستال اکیداً اجتناب کنید. در صورت نیاز به هر گونه پرستش لطفاً توسط همراه بیمار انجام نگیرد.

نکات قابل توجه پس از انجام اسکن

۱. پس از اسکن و به منظور رعامت اینمی، لازم است فاصله ۲ متر را با اطرافیان به مدت ۲۴ ساعت حفظ کنید. فاصله کمتر در زمان کوتاه عانع ندارد.

۲. لازم است طی ۲۴ ساعت پس از پایان اسکن، از تماس نزدیک با خانم های باردار و کودکان زیر ۶ سال برهیز کنید.

۳. در صورتیکه به کودک خود شیر می دهید لازم است تا ۱۲ ساعت پس از اسکن از شیر دهی کودک اجتناب کنید و شیر خود را دوشیده و دور بریزید.

۴. بعد از انجام اسکن عقدار زیادی آب و مایعات مصرف شود.

اسکن کلیه با DMSA

اسکن DMSA به ارزیابی اندازه، شکل و موقعیت کلیه ها می پردازد. این اسکن برای ارزیابی وجود ضایعه در کلیه ها بدبیال عفونت ادراری و با سایر مشکلات کلیوی استفاده می شود.

نکات مهم قبل از انجام اسکن

۱. انجام این اسکن برای باتوان باردار ممنوع می باشد.
۲. لباس راحت و بدون دکمه یا زیپ قلزی بپوشید.

۳. نیازی نیست روز انجام اسکن ناشتا باشید.

۴. قبل از انجام اسکن عقدار زیادی آب و مایعات معرف تهابید.
۵. تمامی مدارک پزشکی مربوط به بیماری خود را همراه داشته باشید.

۶. اگر اسکن کلیه برای کودک شما انجام می شود، عی توانید کودک خود را در آناق اسکن همراهی کنید و بهتر است اسیاب بازی و حوراکی های مورد علاقه کودک را با خود همراه داشته باشید. در