




# برونشیولیت

گروه هدف: کودکان



تهیه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز

با نظرارت آقای دکتر علی اصغر حلیمی (متخصص اطفال)

بازبینی زمستان ۱۴۰۱

- آموزش در مورد اجتناب از حرکت‌های تنفسی به همراه بیمار آموزش داده می‌شود مثل عدم مصرف عطر، حشره کش‌ها، واپتکس و ...
- به خانواده کودک توصیه می‌نماییم در برابر عوامل ویروسی شایع واکسینه شوند (آنفلونزا – پنوموکوک).
- همچنان آموزش داده می‌شود در مواقعی که گرده گل و گیاه فراوان بوده یا آلودگی زیاد است از منزل خارج نشوند.
- از پوشاندن لباس تنگ به کودک خودداری کنید.
- استراحت و خواب مناسب را برای کودک فراهم نمایید.
- کودک را در وضعیتی قرار دهید که احساس آرامش کند و حداکثر تهویه را داشته باشد.
- در شرایطی که کودک تاکی پنه شدید داشته باشد چیزی از راه دهان به او ندهید.
- مایعات دهانی کافی به مقدار کم ولی مکرر می‌تواند کم آبی را کاهش دهد.

منبع: درسنامه پرستاری کودکان

- به کودکی که برونشیولیت دارد داروی ضد سرفه ندهید داروهای ضد سرفه برای کودکی که اشکال تنفسی دارد می‌تواند مضر باشد.
- کودکی که تنفس سریع دارد ممکن است آب بدنش کم شود چون بخار آب زیادی از راه تنفس دفع می‌شود.
- کم آبی در نوزادان می‌تواند خطرناک باشد به کودک از راه دهان مایعات اضافی بدھید.
- در بعضی موارد برونشیولیت شایع ترین علت بستری شدن نوزادان است.
- نوزادی که برونشیولیت دارد احتمالاً به اکسیژن یا مایعات داخل وریدی احتیاج خواهد داشت.





۲. کودک خود را آرام نگه دارید زیرا گریه موجب مشکل تر شدن تنفس می شود.

۳. اگر کودک از شیر تغذیه می کند بهتر است پستان مادر را مکررا در اختیار او گذاشت. این کار به حفظ سطح مایعات کودک کمک خواهد کرد. همچنین به کودکی که غیر از شیر مادر تغذیه دارد مایعات کافی بدھید.

۴. هر ۶ ساعت به اندازه گیری دمای بدن کودک خود پردازید اگر دما بیشتر از ۳۸ درجه باشد برای پایین آوردن آن شربت استامینوفون به کودک خود بدھید.

### مراقبت خانگی

- سعی نکنید که خودتان برونشیولیت را درمان کنید.
- تشخیص و درمان باید توسط پزشک انجام شود.
- اگر کودک سرفه مدام دارد حتی اگر مدت زمان آن کوتاه است به پزشک مراجعه کنید.
- اگر کودک علاوه بر اشکال در تنفس ناشی از احتقان بینی، مشکل دیگری در تنفس دارد به پزشک مراجعه کنید.

### موارد احتیاط

برونشیولیت می تواند یک بیماری وخیم باشد کودک را حتیما به پزشک نشان دهد.



- از آنجا که این بیماری عفونی و اگیردار است کودک مريض را از کودکان دیگر دور نگه دارید.

در محیط هیچگونه آلودگی مانند دود سیگار وجود نداشته باشد.

سختی یا بی نظمی در تنفس، نا توانی در شیر خوردن، رنگ پریدگی، خس خس سینه، امتناع از خوردن و آشامیدن، کم اشتهايی و خواب آلودگی از عالييم اين بیماری است که به محض مشاهده آن باید به پزشك مراجعه کنید.

### علائم

تنفس سریع (بیشتر از ۰ عن تنفس در هر دقیقه)، تنفس دشوار

تب، کبودی لبها و زبان، خواب آلودگی

### آیا خطرناک است

برونشیولیت یا التهاب نایزک ها خطرناک است زیرا می تواند مشکلات تنفسی شدید را در پی داشته باشد.

### ابتدا چکار باید بکنیم

۱. اگر کودک شما با خاطر ناراحتی های تنفسی دچار پریشانی خاطر شده است و دور لبهای او کبود می شود باید به صورت اورژانس درمان شود و بلا فاصله به دکتر مراجعه کنید.



برونشیولیت به التهاب نایزک ها که کوچکترین معبر های تنفسی در ریه هاست گفته می شود. این بیماری اغلب در کودکان زیر ۶ ماه و گاهی ۱۲ ماه دیده می شود.

• علت بروز این بیماری ویروسی است که بطور عمده باعث عفونت ریوی در کودکان می شود.

• در نوزادان عالیم اولیه به شکل یک سرما خوردگی شروع می شود و پس از گذشت یک روز یا بیشتر کودک دچار سرفه و خس خس سینه می شود.

• تنفس تند و خس خس سینه، خوردن و آشامیدن را برای کودک سخت می کند به طوری که برخی از کودکان باید در بیمارستان بستری شوند.

• عالیم اولیه آن مشابه سرماخوردگی معمولی است و ۱ یا ۲ روز ادامه دارد از جمله آب ریزش بینی - سرفه خفیف و گرفتگی بینی که با تب - خس خس سینه و بی اشتهايی کودک همراه است.

• در روز دوم و سوم عالیم بدتر می شود و بیماری ۷ تا ۱۰ روز طول می کشد اما سرفه کردن کودک ممکن است بین ۲ تا ۴ هفتنه طول بکشد.

از آنجا که این بیماری ویروسی است آنتی بیوتیک تجویز نمی شود، در این موارد کودک نیاز به استراحت دارد و باید مصرف مایعات او افزایش پیدا کند بنابراین دفعات شیر دادن و آب دادن را افزایش دهید تا کودک دچار کم آبی نشود. از طرفی اگر کودک به اکسیژن نیاز پیدا کند باید بستری شود.