



لخته خون متحرک در عروق چیست؟

گروه سنی بزرگسال و سالمند



25a2.com

تهیه کنندگان : گروه آموزش به بیمار مرکز
با تأیید اساتید گروه جراحی عروق بیمارستان شهدای تجریش

بازبینی زمستان ۱۴۰۱

روشهای درمانی موجود چیست؟

- ☺ استراحت مطلق و بالا قرار دادن پای متورم
- ☺ تجویز داروهای خوارکی یا تزریقی رقيق کننده خون یا حل کننده لخته طبق صلاح دید پزشک
- ☺ درمان های جراحی

آیا در صورت درمان نشدن ، عارضه ای را به دنبال دارد؟

- ☺ تورم شدید پا و اختلال در راه رفتن
- ☺ تغییر رنگ پا به رنگ قهوه ای و ایجاد زخم
- ☺ آمبولی ریه که طی آن لخته رها می شود و به ریه می رود. جریان خون ریه مسدود شده، باعث مرگ بافت ریه آسیب دیده می گردد.

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس سایت : پرتال بیمارستان شهداء تجریش.

آدرس پستی: تهران - م تجریش - خ شهرداری - بیمارستان شهداء تجریش.

منابع

- که سوزان س. اسلاملترز، برنداجی. بررسی نامه پرستاری برونز و سودارت ۲۰۲۲. قلب و عروق و خون. ترجمه حلیمه امینی و همکاران؛ ویرایش صدیقه سالمی. تهران: سالمی.

www.uptodate.com

چگونه می توان آن را تشخیص داد؟

معاینه توسط پزشک

آزمایش خون

سونوگرافی رنگی و عکس برداری از رگ ها

چگونه می توان از ابتلا به ترومبوز پیشگیری کرد؟

✓ در طول بیماری ها ، از استراحت طولانی در بستر خودداری کنید.

✓ پس از هرگونه اقدام جراحی یا در طی هرگونه بیماری ، هرچه زودتر حرکت دادن اندام های تحتانی (پاهای) را شروع کنید.

✓ در مسافت های طولانی یا اتومبیل یا هواپیما، حداقل هر ۲-۱ ساعت، پاهای خود را حرکت دهید.

✓ به ویژه در صورت مصرف استروژن، سیگار را ترک کنید.

✓ در مسافت های طولانی یا کارهایی که لازم است به مدت زیادی سرپا باشند جوراب ضد واریس بپوشید.

+ علل به وجود آوردن ترومبوز چیست؟

- کندی حرکت خون در ورید که مکانیسم‌های لخته‌کننده خون را تحریک می‌کند.
- آسیب‌های ناشی از ترومما
- تجمع خون ممکن است پس از استراحت طولانی در بستر به دنبال جراحی یا در اثر بیماری ناتوان‌کننده مثل حمله قلبی، سکته مغزی یا شکستگی استخوان رخ دهد.
- بعضی عوامل ارثی نیز فرد را مستعد به ایجاد لخته می‌کند.

+ چه عواملی باعث تشدید بیماری می‌شود

- ✓ سن بالای ۶۰ سال
- ✓ چاقی
- ✓ جراحی (مفصل ران، زانو و یا جراحی لگن در زنان)، سانحه و شکستگی لگن و پaha.
- ✓ بارداری
- ✓ سرطان
- ✓ اختلالاتی چون نارسایی قلبی، سکته مغزی و افزایش غلظت خون
- ✓ سیگار کشیدن

+ علایم شایع لخته خون متحرک در عروق

چیست؟

- تقریباً تا زمانی که رگ‌های بزرگ و اصلی مسدود نشود، هیچ علامتی ندارند. در این موقعیت علائم به شرح زیر می‌باشد:
- ✗ افزایش دمای پا و تپ خفیف
 - ✗ درد در پاهای حساسیت به لمس
 - ✗ تورم یک طرفه عضله پشت ساق پا، قوزک، ران و از قوزک به پایین

- ✗ التهاب و قرمزی برجسته شدن رگ‌های سطحی پا
- ✗ ناراحتی یا درد در راه رفتن که با استراحت بهبود نمی‌یابد.

- ✗ در صورت حرکت لخته به سمت سرخرگ‌های ریه و انسداد آنها، علایمی مثل تنگی نفس، درد قفسه سینه و سرفه خونی نیز بروز می‌نماید که گاهی جزو اولین علائم است.



+ ترومبوز ورید عمیق چیست؟

ترومبوز ورید عمیق عبارت است از بیماری که طی آن یک لخته خون در یک ورید تشکیل می‌شود و ممکن است باعث بسته شدن نسبی یا کامل جریان خون شود و یا لخته حرکت کرده و به ریه برود. این حالت متفاوت از لخته‌های موجود در وریدهای سطحی (واریس) است که در آن به ندرت لخته‌ها رها می‌شوند.

معمولًاً ترومبوز وریدهای عمیق، وریدهای اندام تحتانی (سانق و ران) را درگیر می‌کند ولی گاهی سایر وریدهای بدن را مبتلا می‌کند.

Deep Vein Thrombosis (DVT)

