



حمله آسم

گروه سنی : تمام گروه های سنی



تهیه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز
با تایید دکتر سبز قبایی (متخصص طب اورژانس)
بازبینی زمستان ۱۴۰۱

در صورت بروز هر یک از علائم زیر به اورژانس یا پزشک مراجعه نمایید :

- تشدید دوباره‌ی و بروز حمله به شکل قبل.
- نیاز به استفاده مکرر از اسپری های سبز یا آبی با فاصله‌ی کمتر از ۲-۳ ساعت یا در طول شب.
- بروز تنگی نفس شدید یا عدم توانایی در نفس کشیدن و احساس قطع تنفس.
- سرفه‌های طولانی، پیوسته و شدید پشت سر هم.
- بریده بریده و به سختی صحبت کردن یا عدم توانایی در تکلم.
- سیاه شدن و کبودی لب‌ها / رنگ پریدگی یا تعریق شدید.
- تورم زبان، حلق، گلو و لب‌ها یا تورم اطراف چشم، صورت دست‌ها و پاهای.
- تب و لرز / تهوع و استفراغ.
- ضعف و بی‌حالی یا خواب آلودگی شدید یا کاهش سطح هوشیاری و بیهوشی.
- در صورت نیاز به مراجعه مجدد، برگه خلاصه پرونده خود را همراه داشته باشید.

منابع :

۱. عزیز خانی ر و همکاران . طرح دیتا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .
۲. کتاب برونر و سودارت ۲۰۲۲

- اگر هنگام ورزش دچار علائم می‌شوید می‌توانید ۱۵ دقیقه قبل از شروع ورزش از اسپری آبی استفاده کنید. از ورزش کردن در هوای سرد خودداری کنید.
- از برخورد و تماس با مواد ذکر شده در بالا خودداری کنید.
- از ملحفه و لباسهای کاملاً نخی استفاده کنید.
- از تماس با هر گونه دود خودداری کنید.
- اصول بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی را کاملاً رعایت کنید تا دچار سرما خوردگی و آنفولانزا نشوبید، ابتلا به این بیماریها باعث بدتر شدن علائم آسم می‌شوند، بهتر است سالانه با مشورت پزشک خود واکسن آنفولانزا را تزریق کنید.
- از استرس و اضطراب و فشارهای روانی و هیجانات عاطفی دوری کنید.
- افراد خانواده و نیز دوستان و همکاران نزدیک خود را از وضعیت بیماریتان آگاه کنید و به آنها کاملاً آموزش دهید در صورت بروز حمله‌ی تنفسی چگونه به شما کمک کنند.

پس از ترخیص تا زمان بھبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنید.

- در صورتی که در زمان ترخیص داروی خاصی (مثل کورتن خوراکی) برای شما تجویز شده است فقط همان دارو را طبق دستور و تا زمان معین شده مصرف کنید.
- درمان آسم در اغلب موارد نیاز به مصرف آنتی بیوتیک ندارد، بنابراین از مصرف خودسرانه‌ی این داروها جدا خودداری کنید.
- از ترکیبات گیاهی ناشناخته به عنوان دارو استفاده نکنید.
- از مصرف خود سرانه داروهایی که باعث بروز حمله آسم می‌شوند (مثل: آسپرین، بروفن، آتنولول، پروپرانولول) خودداری کنید.
- اسپری‌های خود را در زمان مشخص و به روش صحیح استفاده کنید، استفاده منظم دائم آنها حتی در زمان‌های بدون علامت از بروز علائم و حمله‌ها جلوگیری می‌کند.
- اسپری‌های آبی (سالبوباتامول) معمولاً اثر فوری دارند و برای درمان سریع علائم به کار می‌روند. بنابر این باید همواره و در هر شرایطی یکی از آنها را همراه خود داشته باشید.

- گرد و خاک و غبار.
- گل‌ها و گیاهان (به خصوص گرده‌ی گل‌ها).
- آلودگی هوا و دوده و ذرات معلق در هوا.
- برخی غذاها (به خصوص گوجه فرنگی، هندوانه، ادویه‌ها، سس‌ها، غذاهای شور و نمک سود، بادام زمینی، گردو، غذاهای دریایی، کنسرو‌ها، انواع شکلات و شیرینی).
- داروهای مختلف (آسپرین، بعضی داروهای ضد درد مثل بروفن، ناپروکسن، برخی داروهای ضد فشار خون مثل آتنولول، و پروپرانولول).
- انواع عطر‌ها و اسانس‌ها.
- انواع ترکیبات به شکل افشاره و اسپری.
- اسید‌ها و مواد شیمیایی و نفتی، شوینده‌ها با بوی تنده و سوزاننده.
- انواع دود.
- انواع کپک و مواد فاسد.
- پارچه‌های پشمی و پرز دار.
- پر، کرک، پوست پرندگان و حیوانات.
- سرمای شدید یا تغییر دمای ناگهانی و شدید.
- خشکی هوا.
- رطوبت شدید (مثل سونا و چشمه‌های آب گرم)
- استرس و اضطراب روانی.
- فعالیت جسمانی سنگین و ورزش (به خصوص در هوای سرد یا آلوده).

بیمار گرامی، شما دچار حمله‌ی حاد آسم شده‌اید و به اورژانس مراجعه کرده‌اید، با توجه به علائم شما، معاینات و بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد علل خطرناک و عوارض مهمی که نیاز به بستری در بیمارستان دارد فعلاً وجود نداشته و در حال حاضر با توجه به بھبود وضعیت تنفسی و رفع علائم می‌توانید به منزل باز گردید.

آسم یک بیماری تنفسی غیر عفونی و غیر واگیر است که در آن راه‌های هوایی که در مسیر عبور هوا (پس از بینی و حلق و نای) به سمت ریه‌ها هستند تنگ و باریک شده و هوای کافی به خوبی به ریه‌ها و داخل بدن نمی‌رسد و باعث بروز علائم زیر می‌شود:

❖ سرفه.

❖ احساس تنگی نفس و سختی تنفس.

❖ گرفتگی و سنگینی قفسه سینه.

❖ خس خس سینه و تنفس صدا دار.

علت بیماری:

معمولانمی توان علت دقیق بیماری را مشخص کرد اما عوامل زیر در افراد مختلف می‌توانند موجب بروز یا تشدید علائم شوند و البته همه بیماران لزوماً با همه این موارد دچار مشکل نمی‌شوند: