



عفونت ادراری

گروه سنی : تمام گروه های سنی



تهریه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز
با تایید دکتر سبزقبایی (متخصص طب اورژانس)
بازبینی زمستان ۱۴۰۱

آب زیاد بنوشید،
جريان زیاد ادرار
باعث شسته شدن
میکروب ها از داخل
مجاري ادراري مى
شود.

منبع :

- عزيز خانی ر و همکاران . طرح ديتا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى .
- كتاب پرستاري برونر و سودارت ۲۰۲۲

در صورت بروز هر يك از علائم زير مجددا
به اورژانس يا پزشك مراجعه کنيد:

- + عدم بهبود علائم در عرض ۴۸ ساعت بعد از شروع درمان و يا تشدید علائم
- + بروز علائم جديد و اضافه شدن به علائم قبلی.
- + درد شديد پهلوها و کمر.
- + بروز يا تشدید تب و لرز يا ادامه ي تب پس از ۲ روز از شروع درمان با آنتي بيوتيك.
- + تهوع و استفراغ شدید.
- + عدم توانايي خوردن يا نوشیدن.
- + بي حالى و کاهش سطح هوشيارى.
- + عدم بهبود كامل پس از ۲ هفتة.
- + بروز بشورات و ضایعات پوستی مثل کهپير که می تواند نشانه حساسیت به آنتي بيوتick باشد
- + در صورت نیاز به مراجعه مجدد، برگه خلاصه پرونده خود را همراه داشته باشید.

- ❖ ادرار خود را نگه ندارید و در صورت احساس نیاز به دفع ادرار سریعاً این کار را انجام داده و مثانه‌ی خود را به طور کامل تخلیه کنید.
- ❖ مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک در خانم‌ها گاهی ممکن است باعث تحریک و بروز عفونت‌های قارچی زنانه شود، بنا بر این در صورت بروز خارش و ترشح سفید رنگ در طول مصرف آنتی بیوتیک به پزشک مراجعه کنید اما به هیچ وجه شخصاً اقدام به قطع مصرف دارو نکنید.
- ❖ اگر از قبل داروی دیگری مصرف می‌کنید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.
- ❖ اگر در اورژانس برای شما آزمایش ادرار یا سونوگرافی انجام شده است، برگه‌ی نتیجه آن را دور نیندازید، چون در صورت مزمن شدن یا تکرار عفونت جهت بررسی‌های تکمیلی به این نتایج برای مقایسه نیاز است.

- ❖ مصرف غلط و نامنظم آنتی بیوتیک‌ها باعث مقاوم شدن میکروب‌ها، باقی ماندن میکروب‌ها و افزایش احتمال تکرار عفونت در آینده می‌شود.
- ❖ ممکن است داروهایی برای بهبود سوزش و درد هنگام دفع ادرار برای شما تجویز شده باشد (مثل فنازوپریدین)، این داروها می‌توانند به طور طبیعی باعث تغییر رنگ ادرار شوند، در این صورت نگران نباشید و مصرف دارو را ادامه دهید.
- ❖ نوشیدن زیاد قهوه، نسکافه و سایر نوشیدنی‌های حاوی کافئین زیاد تا زمان بهبود، ممکن است با تحریک مثانه باعث تشدید علائم شود.
- ❖ از مصرف زیاد انواع شکلات، غذاهای تن و ادویه جات و نوشیدنی‌های گاز دار (مثل نوشابه) خودداری کنید.
- ❖ کیسه آب گرم یا حolle‌ی گرم باعث تسکین درد شکم و پهلوها می‌شود.

بیمار گرامی با توجه به علائم، پس از بررسی‌ها و معاینات انجام شده، تشخیص عفونت ادراری برای شما مطرح می‌باشد، در حال حاضر با توجه به این تشخیص و عدم وجود عوارض خاص، نیاز به بستری در بیمارستان ندارید و می‌توانید به منزل باز گردید.

پس از ترجیح تا زمان بهبودی به نکات و توصیه‌های زیر توجه کنید:

- ❖ آب زیاد بنوشید، جریان زیاد ادرار باعث شسته شدن میکروب‌ها از داخل مجاری ادراری می‌شود.
- ❖ استراحت کافی داشته باشید تا بدن شما قدرت کافی برای مبارزه با میکروب‌ها را داشته باشد.
- ❖ در صورت تجویز آنتی بیوتیک دارو را دقیقاً در زمان معین مصرف کنید و حتماً دوره‌ی درمان را کامل کنید، این زمان معمولاً ۳-۷ روز است ولی در عفونت‌های شدید که کلیه‌ها را در گیر می‌کند ۱۴-۲۰ روز ادامه می‌یابد.