



دوکسوروبیسین (آدریاما پسین)

گروه هدف: بیمار و خانواده



تهیه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز

با تأیید: دکتر رخشا (متخصص رایوتراپی انکولوژی)

بازبینی زمستان ۱۴۰۱

- عملکرد قلبی بایستی پیش از شروع درمان و سپس به صورت دوره ای در طول درمان و پس از تکمیل دوره درمان پایش شود.

منابع:

داروهای ژنریک ایران. دکتر فاطمه تیموری سال

۱۳۹۵

- حین درمان احتمال ریزش مو وجود دارد؛ کوتاه کردن مو و استفاده از کلاه گیس می تواند موثر باشد.
- از مصرف غذاهای داغ، سفت و حاوی اسید سیتریک اجتناب کنید.
- روزانه دهان خود را معاینه کنید.
- ممکن است رنگ ادرار و دیگر مایعات بدن به مدت ۴۸ ساعت به قرمز-نارنجی تغییر کند.
- از تماس با افراد عفونی و تجمع در اماکن شلوغ اجتناب کنید.
- طی درمان و تا ۴ ماه بعد آن از روش های ضد بارداری استفاده کنید، از شیردهی خودداری کنید.
- طی دوره درمان از انجام واکسیناسیون اجتناب ورزید .

مراقبت ها

- به طور هفتگی آزمایش شمارش گلبول های خونی و پلاکتی انجام داده شود؛ در صورتی که گلبول های سفید (WBC) کمتر از ۴۰۰۰ یا تعداد پلاکت کمتر از ۷۰ هزار شد، دارو را قطع کرده و به پزشک اطلاع دهید.
- مصرف مایعات را به ۲ تا ۳ لیتر در روز افزایش دهید.
- ۳ تا ۴ بار در روز دهان را با آب بشوئید، دندان ها را ۲ تا ۳ بار در روز با مسواک نرم مسواک بزنید.



عوارض جانبی

- قلبی عروقی: افزایش فشارخون، افزایش و یا کاهش ضربان قلب، درد قفسه سینه
- گوارشی: تهوع، استفراغ، بی اشتهایی و سمیت کبدی
- ادراری تناسلی: ناتوانی جنسی، عقیمی
- خونی: کاهش در تعداد پلاکت ها و گلبول های سفید و کم خونی
- پوستی: ریزش موی برگشت پذیر



دوکسوروبیسین (آدریامايسين)

این دارو، یک داروی شیمی درمانی است که در درمان سرطان مثانه، سینه، ریه، تخمدان، معده، تیروئید و بیضه استفاده می شود. راه تجویز این دارو وریدی است.

