



تاكى پنه گذاري نوزادان (TTN)

گروه هدف والدين



تهيه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز

تايدكننده دكتور شيرين محمدی (فوق تخصص نوزادان)
بازيباني زمستان ۱۴۰۱



- بهبودی معمولاً ظرف ۲ الی ۳ روز صورت می گیرد و درمان حمایتی است که شامل دادن اکسیژن کلاهک و مانیتورینگ گازهای شریانی یا پالس اکسی متري می باشد.
- در صورتی که دیسترس تنفسی بدتر شد، بسته به شرایط نوزاد تصمیم گیری شود.

mekanizm aثر dastgah tawohie ba fshar mabt

- بهبود اکسیژن رسانی

- بهبود بخشیدن به عملکرد ریه

- جلوگیری از کلپس آلوئول ها

- کاهش آپنه

منبع:

نوزادان نلسون

بیماری های تنفسی نوزادان مخصوصاً سندروم زجر تنفسی در جنس پسر و در متولدين سزارین انتخابی بیش از متولدين سزارین اورژانسی و زایمان طبیعی بوده است.

درمان

- دیسترس خفیف تنفسی به علت TTN نوزاد اغلب طی ۴ ساعت اول پس از تولد وقتی که باقیمانده مایع ریه باز جذب می شود بهبود می یابد.
- اگر دیسترس تنفسی بیش از ۴ ساعت ادامه یابد نوزاد به ارزیابی بیشتر و رادیوگرافی قفسه سینه برای تایید تشخیص و راهنمایی برای مداخله های مراقبتی بیشتر نیاز دارد.

چه نوزادانی مبتلا می شوند؟

- نوزادان نارس
- نوزاد بالغی که به طریق سزارین متولد شده
- نوزادانی که بادپرسیون تنفسی متولد شده اند.
- همه نوزادانی که در پاکسازی مایع از ریه دچار مشکل بوده اند.
- نوزادان مادر دیابتی و آسماتیک

عوامل خطر کدامند؟

- آسم و دیابت مادری
- این اختلال می تواند در نوزادان نارس دچار سندروم دیسترس تنفسی و در نوزادان بالغ که مایع آمنیوتیک مکونیومی داشته اند رخ دهد.

تاكی پنه گذاري نوزادان (TTN)

تاكی پنه گذاري نوزادان به معنای سختی تنفس ناشی از تاخیر در بازجذب مایع باقی مانده از زمان جنینی در ریه می باشد. این اختلال ممکن است با شروع زودهنگام تاكی پنه همراه باشد که گاهی با تو کشیدگی قفسه سینه یا ناله در هنگام بازدم و گهگاه سیانوزی که با مقدار کم اکسیژن برطرف می شود مشخص می گردد.

