




نفرکتومی

گروه هدف: بیمار و همراهان



تهییه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز

با نظارت دکتر عصمت قانعی (فوق تخصص نفروЛОژی)
بازبینی زمستان ۱۴۰۱

- حالت تهوع داشتید یا شروع به استفراغ کردید.
- درد زیادی داشتید.
- به طور غیر معمول ضعیف شدید.
- زختان ترشحات داشت یا خونریزی کرد.
- نفس هایتان کوتاه شد.
- در هنگام عبور ادرار مشکل داشتید.
- در طول ساعات اداری با پزشک خود تماس بگیرید اگر:

 - درباره فرآیند عمل جراحی یا نتیجه آن سوال داشتید.
 - پا و مج پایتان شروع به تورم کرد.
 - درخواست قرار ملاقات دیگری داشتید

: منبع

WWW.Pishgiri.ir

از فعالیت های سنگین مثل وزنه برداری در ۶ هفته اول بعد از عمل اجتناب کنید. پس از آن، طبق دستور پزشک خود، آرام آرام کارهای سنگین تر را شروع کنید.

از پزشک خود درباره داروهای مورد نیاز برای تسکین دردتان و چگونگی مراقبت از خود در طی دوران بهبودی، سوال کنید. حذف یک کلیه ممکن است عملکرد کلیوی شما را کاهش دهد و سبب می شود هنگام مصرف دارو با مشکلاتی روبرو شوید. از پزشکتان بخواهید که لیستی از داروهایی که نباید در این دوران مصرف کنید، را به شما بدهد. داروهای حاوی استامینوفن و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (مثل ایبوپروفن) جزو داروهایی می باشند که نباید مصرف کنید. زمان مراجعة بعدی خود برای چکاپ را هم سوال کنید.

چه زمانی باید با پزشک خود تماس بگیرم؟

فوراً با پزشک خود تماس بگیرید اگر:

- تب بیشتر از ۳۷/۸ درجه سانتی گراد داشتید.

۱ اگر به دلیل یک مشکل پزشکی روزانه آسپرین و وارفارین مصرف می کنید، از پزشک خود درباره لزوم قطع مصرف آن قبل از عمل جراحی سوال کنید.

۲ شب قبل از عمل، شام سبک مثل سوپ یا سالاد بخورید.

۳ بعد از نیمه شب و صبح قبل از عمل، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید. حتی چای، قهوه و آب هم ننوشید.

مراقبت های بعد از عمل جراحی

ممکن است به مدت ۴ تا ۷ روز در بیمارستان بستره باشید. یک کاتتر (لوله) را به مدت چند روز داخل مثانه شما می گذارند تا ادرار تخلیه گردد و فشار کم شود. این کاتتر قبل از ترخیص شما، خارج می گردد.

در طول دو هفته اول بعد از عمل، به انجام فعالیت سبک مثل پیاده روی تشویق می شوید.

چگونه خود را برای عمل نفرکتومی ساده آماده کنم؟

۱ از دستورات پزشک خود پیرامون عدم مصرف سیگار قبل و بعد از عمل جراحی پیروی کنید.

۲ بعد از عمل جراحی زمانی را باید در منزل استراحت کنید.

۳ افراد سیگاری بعد از عمل جراحی با سرعت کمتری التیام می یابند و احتمال مشکلات تنفسی در حین عمل جراحی برای این افراد بیشتر از سایرین می باشد.

۴ اگر در هفته قبل از عمل جراحی نیاز به مسکن خفیف داشتید، به جای استفاده از آسپرین، ایبوپروفن و یا ناپروکسن از استامینوفن استفاده کنید.

۵ از داروهای حاوی آسپرین مثل داروهای سرماخوردگی بدون نسخه اجتناب کنید. این کار از خونریزی اضافی شما در طول عمل جلوگیری می کند.



نفرکتومی ساده چیست؟

نفرکتومی نوعی عمل جراحی برای برداشتن کلیه ها می باشد.

در چه مواقعي از اين عمل استفاده مي گردد؟

۱ سرطان کلیه

۲ وجود سنگ های بزرگ در کلیه در حضور عفونت مقاوم به درمان

۳ ندرتا نارسايی پيشرفة کلیه و کوچک بودن کلیه که سبب بالا رفتن فشار خون مقاوم به درمان می شود.

۴ عفونتی که با آنتی بيوتيك درمانی، مداوا نگردد و باعث صدمه به بافت کلیه شود.