



یبوست

گروه هدف: بیماران سرطانی



تهیه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز

با نظارت دکتر افشین رخشا
(متخصص انکولوژی - رادیوتراپی)

بازبینی زمستان ۱۴۰۱

با پزشک تماس بگیرید اگر بیمار

- اجابت مزاج در طی ۳ روز نداشته است.
- خون در اطراف ناحیه مقعد و یا در مدفوع وجود دارد.
- یک یا ۲ روز بعد از مصرف ملین هنوز حرکت روده وجود ندارد.
- گرفتگی و کرامپ شکمی و یا استفراغ دارد، که متوقف نمی شود.

www.pishgiri.ir

منبع:

مراقبان چه می توانند انجام دهند

- برای بیمار آب آلو، آب لیمو داغ، قهوه و یا چای برای کمک به تحریک حرکات روده و اجابت مزاج فراهم کنید.
- بیمار را به خوردن مایعات اضافی تشویق کنید.
- به بیمار جهت ثبت دفعات اجابت مزاج کمک کنید.
- غذاهای با فیبر بالا، مانند غلات سبوس دار، میوه های خشک و سبوس را فراهم کنید.
- قبل از استفاده از ملین با پزشک صحبت کنید.



بیمار چه اقداماتی می تواند انجام دهد:

- مایعات بیشتری بنوشید. آبمیوه های پاستوریزه و مایعات گرم و داغ بخصوص در صبح مفید هستند.
- هر روز غذاهای با فیبر بالا بخورید مانند: نان های سبوس دار و غلات و حبوبات، میوه های خام تازه با پوست و دانه، سبزی های تازه، آبمیوه ها و خرما، زردآلو، کشمش، آلو، آب آلو و آجیل.



یبوست

یبوست عبور دشوار و به ندرت مدفوع سخت است، که اغلب باعث درد و ناراحتی می شود. یبوست به علت مصرف بسیار کم مایعات و کافی نبودن حرکت روده ها اتفاق می افتد. کمبود فعالیت، ضعف، نادیده گرفتن نیاز به اجابت مزاج، داروهای ضددرد، یا مصرف محدود غذا و مایعات می توانند منجر به این مشکل شوند.

در جستجوی چه مواردی باشیم

- اجابت مزاج اندک و سخت
- معده درد یا گرفتگی عضلات (کرامپ)
- خروج مقداری گاز و یا آروغ زدن مکرر
- شکم برآمده و متورم
- نداشتن اجابت مزاج منظم در عرض ۳ روز گذشته
- وجود استفراغ یا تهوع
- احساس پری و ناراحتی

- از مواد غذایی و نوشیدنی هایی که باعث تولید گاز می شوند مانند کلم بروکلی و نوشابه های گازدار اجتناب کنید.
- از مصرف هرگونه مواد غذایی که باعث یبوست شما می شود مانند پنیر یا تخم مرغ اجتناب کنید.
- از تنقیه یا شیاف استفاده نکنید. قبل از استفاده از نرم کننده های مدفوع یا ملین با پزشک یا پرستار خود صحبت کنید.
- به محض اینکه شما نیاز به اجابت مزاج دارید به توالت بروید.
- دفعات اجابت مزاج را با دقت برای شناسایی مشکلات ثبت کنید.

