

فرم شماره ۲-آموزش به بیمار و خانواده

مراقبت های پس از ترخیص

بریس و ارتوز یا کمربند سینه ای کمری خاجی

شماره پرونده:

نام خانوادگی:	نام:	بخش: اتاق: تخت:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد:	تشخیص (علت بستره):	تاریخ پذیرش:
مراقبت در منزل :	<input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد		

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

- یک بار در هفته بریس خود را بالکل تمیز و خشک کنید.
- از اقدام به تعمیر بریس اجتناب کنید و اینگونه امور را به متخصصین واگذار کنید.
- از پرت نمودن بریس و قرار دادن در محل های نامناسب مثل مرطوب، حرارت زیاد، شعله آتش، اجتناب شود.
- استفاده از بریس دیگران حتی به صورت موقت خودداری کنید.
- هر روز استحمام کرده و دوش بگیرید.
- همیشه یک زیرپوش یا تی شرت ۱۰۰٪ کتان زیر بریس خود بپوشید. تا از حساسیت و کوفتگی که درزها ممکن است ایجاد کنند جلوگیری کنید.
- تا جایی که امکان دارد بریس خود را محکم بیندید اگر شل باشد امکان آسیب زدن به پوست افزایش می یابد.
- اگر با مشکلات پوستی نظری پوسته پوسته شدن رو برو شدید پوشیدن بریس را با نظر پزشک تا بهبودی کامل به تعویق بیاندازید.
- اگر احساس کردید که نقاطی از پوست شما تیره تر از نقاط دیگر می شود نگران نباشید، این طبیعی است و زمانی که درمان بریسی شما تمام شد این نقاط تیره ناپدید خواهد شد.
- از کرم ها، لوسيون ها و دیگر پودرها در زیر بریس استفاده نکنید زیرا آنها پوست را نازک تر و مستعد آسیب می کنند.
- بهتر است همیشه پیش از پوشیدن بریس آن را بازرسی کنید.
- مراقب باشید که قسمت های فلزی بریس با اندام شما تماس پیدا نکند در غیر اینصورت سریعاً به مرکز ارتوپدی فنی مراجعه کنید.
- اجازه ندهید که مشغله های روزانه موجب استفاده نامناسب شما از بریس شود و سعی کنید عادت خوب راه رفتن را در خود ایجاد کنید.
- عضو محصور شده با بریس را همواره با آب و صابون شستشو داده و تمیز نگهدارید.
- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان مراجعه کنید
- ایجاد زخم در هر نقطه از پوست
- نقاطی از پوست که تحت کشش و فشار بیش از حد بریس قرار گیرد.
- التهاب بیش از اندازه در زیر بریس
- درد شدید و مداوم
- پوسته پوسته شدن پوست زیر بریس