

سندروم آسیبراسیون مکونیوم

مدفوع قبل از تولد نوزاد مکونیوم نامیده شده است. نوزاد به دلایل مختلف ممکن است قبل از تولد یا حین زایمان مدفوع دفع کند. مایع آغشته به مکونیوم ممکن است به داخل دستگاه تنفسی نوزاد وارد شده باعث تنگی نفس وی شود. دفع مدفوع ممکن است به دلیل کمبود اکسیژن یا یک مشکل یا بیماری زمینه ای نوزاد باشد که حین بستری نوزاد در بیمارستان تشخیص داده شود.

مراقبت در منزل:

- پیگیری ها و مراقبت های بعد از ترخیص را با جدیت انجام دهید. این یک قرار ویزیت بسیار مهم است و نباید به هیچ دلیلی کnar گذاشته شود.
 - از قرار دادن نوزاد در معرض دود و هوای آلوده اجتناب شود.
 - از بردن نوزاد به مکانهای شلوغ و پر ازدحام با آلودگی هوا خودداری کنید.
 - در هنگام تعویض لباس و حمام دادن از سرد شدن نوزاد جلوگیری شود.
 - محیطی آرام و راحت و با حداقل سر و صدا را برای نوزاد فراهم کنید.
 - حفظ درجه حرارت نوزاد مهم می باشد و از کلاه استفاده کنید.
 - از تماس افراد مبتلا به بیماری های عفونی و سرماخورده با نوزاد خود، خودداری کنید.
 - بهداشت دهان نوزاد مهم است و با استفاده از آب استریل، دهان نوزاد را کاملاً شستشو دهید.
 - کودک را در آغوش بگیرید تا تماس پوست با پوست انجام شود و از بیقاراری نوزاد جلوگیری کنید.
 - نوزاد را در معرض دود سیگار قرار ندهید. اگر شما یا فرد دیگری در منزل سیگار میکشید زمان آن رسیده سیگار را ترک کنید.
 - قبل از تماس با نوزاد شستن دست ها رعایت گردد. در صورتی که فرد دیگری از نوزاد مراقبت میکند این موضوع را به او گوشزد کنید.
 - در صورتی که دچار سرماخوردگی هستید ماسک بزنید و از نوزاد فاصله بگیرید.
 - داروهای تجویز شده را طبق دستور پزشک استفاده کنید و پیش از اتمام آنها مجدداً با پزشک نوزاد مشورت و ملاقات داشته باشید.
- در صورت مشاهده علام زیر به بیمارستان مراجعه کنید:
- اگر نوزاد ، بعد از روز چهارم کمتر از ۶ کنه خیس در روز دارد
 - اگر نوزاد ، بعد از روز چهارم عمر کمتر از ۴ دفع مدفوع دارد
 - اگر نوزاد زردی دارد.
 - اگر نوزاد کبود می شود یا اختلال هوشیاری دارد.
 - عدم اشتها به شیر یا استفراغ مکرر

- نوزاد کمتر از ۸ بار در ۲۴ ساعت یا نصف مقدار معمول شیر می خورد و بی حال یا خواب آلود است.
- اگر بند ناف قرمز و متورم شد یا ترشح خونی یا چرکی داشت باید نوزاد را فوری نزد پزشک برد.