

		شماره پرونده:	
نام خانوادگی:	نام:	بخش: اتاق: تخت:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد: جنس: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل:

- مواردی چون تغییر شدید دما، مجاورت طولانی با نور خورشید، تکان‌های شدید ویال و سرنگ محتوی دارو مواردی بر عملکرد دارو اثر می‌گذارند.
 - از حمل دارو در اتومبیلی که دمای داخل آن بیش از ۲۵ درجه سانتی گراد باشد خودداری کنید.
 - از قرار دادن دارو در فریزر جدا خودداری کنید.
 - تازمانی که از دارو استفاده نکرده اید آن را در یخچال درون جعبه مقوایی خود با دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد نگه دارید.
 - دارو نباید بیش از ۶۰ دقیقه در دمای اطلاق نگه داشته شود.
 - از گرم کردن دارو با استفاده از مالش شدید در میان کف دو دست، مایکروویو، فر معمولی و آب گرم خودداری کنید.
 - دارو معمولاً باید شفاف و بدون رنگ باشد. با مشاهده کدورت یا رنگی شدن دارو و ذرات معلق و یا کف نباید از دارو استفاده کرد.
 - مصرف بیش از حد دارو و یا سرعت بالای انفوزیون ممکن است باعث کاهش فشار خون، سردرد، تهوع، گیجی، درد مفاصل، بی‌حسی بدن، درد شکم، درد عضلات و ادم گردد. در صورت بروز این نشانه‌ها به پرستار اطلاع دهید.
 - این دارو با سایر داروها و یا محلول‌های تغذیه‌وری نباید مخلوط شود. از مصرف دارو بدون اجازه پزشک خودداری کنید.
 - در صورت بروز علائم بی‌اشتهایی، تهوع، یبوست، دل‌درد، خشکی دهان یا احساس تشنگی با پزشک مشورت کنید.
 - دارو در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتی گراد و در پوشش بسته نگهداری شود.
 - این قرص در ابتدا و یا بین غذا مصرف شود. به صورت دوره‌ای و با نظر پزشک آزمایش کلسیم و فسفر را انجام دهید.
 - دارو را دور از نور و حرارت نگهداری کنید.
 - عارضه اصلی افزایش فشار خون و دیابت، نارسایی کلیه‌ها می‌باشد. لذا اغلب بیماران دیالیزی از داروهای کاهش‌دهنده فشار خون و قند استفاده می‌نمایند. از قطع ناگهانی دارو پرهیز شود.
 - اگر در حین دیالیز دچار افت فشار خون یا قند می‌شوید، فقط وعده دارویی قبل از دیالیز را مصرف نکنید.
 - کلیه داروها، حتی داروهایی که پزشکان غیر دیالیز برای شما تجویز می‌کنند، باید با اطلاع پزشک نفرولوژیست شما باشد.
 - از مصرف هرگونه مسکن به خصوص متوکاربامول و باکلوپن مگر با تجویز پزشک معالج خود، خودداری کنید.
 - داروها در ساعت مشخص مصرف شود. در صورتی که دارویی را فراموش نمودید و تا ساعت مصرف بعدی زمان زیادی دارید آن را مصرف کنید.
 - ولی اگر به زمان مصرف بعدی نزدیک است از مصرف آن خودداری کنید.
 - داروها را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
 - قرص‌های تاریخ مصرف گذشته را در منزل نگه‌داری نکنید.
 - همیشه به میزان کافی داروهای مصرفی را در منزل داشته باشید و پیش از تمام شدن آن، دوباره نسخه را از داروخانه تهیه کنید یا به پزشک مراجعه کنید.
 - اگر قصد سفر دارید، حتماً مطمئن شوید که دارو به میزان کافی برای آن مدت به همراه دارید.
 - در صورت مراجعه به هر پزشک دیگری، حتماً پزشک را از مصرف داروها مطلع کنید.
 - خودسرانه و بدون مشورت با پزشک خود، داروهای مصرفی خود را قطع و یا تغییر ندهید.
- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان مراجعه کنید**
- مشاهده عوارض دارویی مانند بی‌اشتهایی، استفراغ، اسهال و ...