

سکته مغزی

مراقبت در منزل:

رژیم غذایی:

۱. جهت شروع تغذیه بیمار را در وضعیت کاملاً نشسته قرار دهید.
۲. از رژیم پر فیبر مانند میوه و سبزی به همراه مایعات فراوان در صورت نداشتن ممنوعیت استفاده کنید زیرا بیماران مبتلا به سکته مغزی در اثر کم تحرکی دچار یبوست است.
۳. وعده های غذایی را در حجم کم و تعداد زیاد حدود ۵ الی ۶ وعده انتخاب کنید.
۴. از رژیم غذایی کم چرب و کم نمک استفاده کنید.
۵. در صورتیکه در طی تغذیه بیمار به سرفه بیفتد یا قادر به بلعیدن لقمه نباشد و مدتی لقمه را در دهان نگه دارد یا به سختی قورت دهد و یا در هنگام بلع احساس درد کند از راه دهان چیزی به بیمار ندهید و با پزشک بیمار مشورت کنید.

بازتوانی:

۱. اندامهای آسیب دیده را بطور غیر فعال ورزش دهید و ۴ الی ۵ دقیقه در روز در محدوده حرکتی کامل، آنها را به حرکت در آورید. مراقب باشید که حرکتها شدید نباشد چون باعث آسیب به عضو و حتی دررفتگی می شود.
۲. در صورتی که در یک عضو بیمار ضعف اندام وجود دارد بیمار را تشویق کنید تا در طول روز به انجام ورزش در این نیمه بپردازد. (حتی با کمک نیمه سالم بدن)
۳. بیمار را تشویق کنید از نیمه سالم بدن استفاده کند تا احساس قدرت بیشتری کند.
۴. جهت افزایش حس اعتماد به نفس انجام کلیه اموری را که بیمار قادر به انجام آن می باشد را به خود او واگذار کنید.
۵. بی خوابی معمولاً شایع است روشن بودن چراغ، سرو صدا می تواند موجب بی خوابی گردد تجویز آرام بخش، طبق دستور پزشک نیز به خواب کمک می کند.
۶. از وسایل کمک حرکتی مانند (عصا، چوب زیر بغل و ...) استفاده کنید.
۷. مصرف الکل و سیگار را ترک کنید. برای کمک به ترک، از مشاوره استفاده کنید.

داروها

۱- داروها را در فواصل منظم طبق دستور پزشک استفاده کنید و از قطع داروها بدون اجازه پزشک خودداری کنید.

۲- به طور منظم جهت ادامه درمان به پزشک معالج مراجعه کنید.

در صورت مشاهده موارد زیر با اورژانس تماس بگیرید.

- ✚ بیحسی یا ضعف ناگهانی در صورت، بازوها، یا پاها به ویژه در یک سمت از بدن
- ✚ گیجی ناگهانی و یا مشکل ناگهانی در صحبت کردن یا فهمیدن صحبت دیگران، مشکل ناگهانی در بینایی یک یا هر دو چشم،
- ✚ مشکل ناگهانی در راه رفتن ،
- ✚ سرگیجه، عدم تعادل، عدم شنوایی یا عدم هماهنگی
- ✚ سردرد ناگهانی، شدید و بی سابقه و بدون دلیل مشخص