



داروی ریتوکسی مَب



تهیه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز

با تائید: دکتر دادخواه (استادیار-متخصص پوست)

بازبینی بهار ۱۴۰۳

عوارض جانبی ریتوکسی مَب

- ✓ علائم شبیه آنفلوانزا
- ✓ خارش، بثورات پوستی
- ✓ گرگرفتگی، تب ولرز
- ✓ خس خس سینه
- ✓ تنگی نفس
- ✓ کاهش فشار خون
- ✓ شوک آنافیلاکسی
- ✓ کاهش مقاومت در برابر عوامل میکروبی

خود مراقبتی بیماران بعد از دریافت ریتوکسی مَب

- برای کاهش خطر ابتلا به عفونت از تماس با افرادی که علام سرما خوردگی و آنفلوانزا دارند پرهیز کنید.
- از مصرف لبنیات غیر پاستوریزه پرهیز کنید.
- از مصرف انواع گوشت نیم پز پرهیز کنید زیرا در معرض عفونت سالمونلا قرار خواهید گرفت.
- در صورت بروز تورم پاها ، تنگی نفس باید به پزشک خود اطلاع دهید.
- افراد با سابقه دریافت ریتوکسی مَب تا یکسال بعد از دریافت دارو نباید باردار شوند.

منبع:

www.nhs.uk

ارزیابی قبل از تجویز ریتوکسی مَب

گرفتن تاریخچه کامل از بیمار شامل:

- ❖ وجود بیماری های دیگر همانند بیماری های قلبی -عروقی و ریوی
- ❖ وجود عفونت یا هرگونه علائم بیماری عفونی (تب، گلودرد، سوزش ادرار، سرفه های مداوم، پوست قرمز و یا زخم های باز، آبله مرغان یا زونا)
- ❖ آلرژی

ارزیابی قبل از انفوزیون ریتوکسی مَب

- ✓ گرافی قفسه سینه
- ✓ تست بارداری
- ✓ الکتروکاردیوگرافی EKG
- ✓ آزمایشات کامل خونی، کبدی،هیپاتیت، تست PPD و IGRA

احتیاطات قبل از تزریق ریتوکسی مَب

قبل از دریافت دارو هر واکسنی (واکسن کرونا) را به روز کنید زیرا اگر پس از درمان، واکسن تزریق شود ممکن است اثر واکسن به اندازه کافی نباشد.

پاسخ به درمان بسیار متغیر است : برخی از بیماران فقط نیاز به یک دوره و برخی از بیماران نیاز به ادامه داروهای دیگر یا تزریق منظم ریتوکسی ماب برای کنترل وضعیت خود دارند.

ریتوکسی ماب چگونه مصرف می شود؟

ریتوکسی ماب بصورت داخل وریدی در بیمارستان تزریق می شود. انفوزیون اول چندین ساعت طول می کشد اما انفوزیون بعدی معمولاً سریعتر است.

✚ هر دوره ریتوکسی ماب معمولاً به صورت دو انفوزیون داده می شود. هر انفوزیون به فاصله دو هفته داده می شود.

✚ گاهی اوقات چهار انفوزیون به فاصله یک هفته داده می شود.

✚ درمان را می توان در صورت از بین رفتن اثر تکرار کرد، که اغلب ۱۸-۱۲ ماه پس از تزریق اول است، اما در برخی بیماران می تواند بسیار طولانی تر باشد.

✚ اگر به ریتوکسی ماب پاسخ دهید در عرض ۲ الی ۱۶ هفته احساس بهتری خواهید داشت.

موارد منع استفاده از ریتوکسی ماب چیست ؟

موارد منع، شرایط یا شرایطی هستند که ممکن است درمان با ریتوکسی ماب را غیر مجاز می کند. این موارد عبارتند از :

- ✓ سابقه حساسیت به ریتوکسی ماب
- ✓ اختلال قلبی شدید
- ✓ عفونت حاد فعال ، عفونت مزمن و ابتلا به نقص ایمنی شدید
- ✓ بیماری های سرکوب شده سیستم ایمنی
- ✓ حاملگی یا شیردهی

چرا برای شما ریتوکسی ماب تجویز شده است؟

استفاده از ریتوکسی ماب در بسیاری از بیماری های خودایمنی باعث کنترل طولانی مدت بیماری شده و فرد را از مصرف داروهای مانند سیکلوفسفامید، مایکوفنولات و آزاتیوپرین بی نیاز می کند.

هدف از درمان معمولاً کنترل شرایط زمینه ای و کاهش دوز سایر درمان ها ، مانند قرص های استروئیدی است.

ریتوکسی ماب چیست و چگونه عمل می کند؟

دارویی است که جهت کاهش فعالیت سیستم ایمنی، درمان برخی انواع بیماری های خود ایمنی و سرطان ها بکار می رود.

ریتوکسی ماب دارویی است که به عنوان یک درمان بیولوژیکی یا بیولوژیک شناخته می شود. ریتوکسی ماب آنتی بادی است که بصورت انتخابی به لنفوسیت های B دارای آنتی ژن CD20 متصل شده و باعث لیز سلول می شود. با حذف سلول های B سطح اتو آنتی بادی کاهش یافته و التهاب و اثرات آن کاهش می یابد . در بخش پوست معمولاً ریتوکسی ماب جهت درمان بیماری های خودایمنی تاولی مورد استفاده قرار می گیرد.

