


# عفونت ادراری

## گروه هدف: والدین



منبع: درسنامه پرستاری کودکان



تهیه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز  
با نظرارت آقای دکتر سید عباس اسحاق حسینی فوق  
تخصص نفروЛОژی اطفال

بازبینی تابستان ۱۴۰۳

۷. قبل از تعویض پوشک و یا شستن محل ادرار و مدفوع کودکتان حتماً دست‌های خود را بشویید

۸. همیشه هنگام شستن فرزندتان ابتدا محل ادرار و سپس محل مدفوع او را بشویید. این کار مانع انتقال میکروب‌های روده به مجرای ادرار کودک می‌شود.

۹. از بیوست کودکتان پیشگیری کنید زیرا احتمال عفونت ادراری بالا می‌رود.

۱۰. در صورت عودهای مکرر عفونت ادراری با پزشک متخصص بیماری‌های کلیوی کودکان مشورت کنید تا شناسایی علت عود بیماری از پیشگیری آن دست بر ندارید.

۱۱. از صابون‌های معطر و یا حمام کف برای کودکان باید پرهیز کرد.

۱۲. مطمئن باشید که کودک به اندازه کافی آب می‌نوشد و هیدراته است به طوری که ادرار به طور منظم دارد.

۱۳. استفاده از آب زغال اخته برای پیشگیری از عفونت ادراری توصیه می‌شود. همچنین استفاده از پروبیوتیک‌ها که به صورت پودر و یا قرص یا ماست و دوغ حاوی پروبیوتیک و فراورده‌های لبنی نیز وجود دارد توصیه می‌شود.

منبع:

[www.pishgiri.ir](http://www.pishgiri.ir)

## توصیه‌های بهداشتی به والدین:

۱. طول دوره درمان را کامل کنید. به عبارت دیگر داروهای تجویز شده توسط پزشک را خودسرانه قطع نکنید.

۲. ۴ روز و ۲ هفته بعد از اتمام داروها مجدداً نمونه ادرار جهت کشته گرفته شود تا از درمان کامل عفونت اطمینان حاصل کنید.

۳. کودک را به مصرف زیاد مایعات مثل آب - چای کمرنگ - آب سبب و مایعات دیگر تشویق کنید تا عفونت دفع شود.

۴. اجازه ندهید فرزندتان ادرار خود را به مدت طولانی نگه دارد و یا آن را تخالیه نکند.

۵. تا حد امکان از پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان و یا پلاستیکی به کودک خودداری نمایید. لباس نخی ترجیح داده می‌شود زیرا کمتر رطوبت را به خود نگه می‌دارد.

۶. لباس‌های کودک را با لباس دیگری که آلودگی بیشتری دارند نشویید. به عنوان مثال لباس‌های فرزندتان را با لباس‌های دیگر در ماشین لباس شویی نشویید.

## عفونت مجاری ادراری در کودکان

عفونت مجاری ادراری به معنی عفونت پوست مجرای ادرار - مثانه- حلب و سایر قسمت های سیستم ادراری مثل لگنچه کلیه و اطراف کلیه می باشد.

در رابطه با عفونت ادراری نکات زیر قابل ذکر می باشد:

شیوع این بیماری به طور قابل ملاحظه ای با سن و جنس ارتباط دارد. عفونت ادراری در نوزادان ختنه نشده شایعتر است ولی بعد از دوره نوزادی در دختران شیوع بیشتری دارد. ۲/۵ درصد دختران در گروه سنی ۷-۱۱ سال مبتلا می شوند. عفونت ادراری در این سنین در پسران ختنه شده کاملاً کمتر است. ۰/۵ درصد احتمال عود مجدد در دختران وجود دارد. تشخیص و درمان صحیح و کامل آن به ویژه در کودکان زیر ۳ سال از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تشخیص آن مشکل بوده و خطر ابتلا و درگیری کلیه و نارسایی آن زیاد است. راه رسیدن باکتری به مجاری در دوره نوزادی جریان خون و در سایر سنین از راه صعود از پیشابرای (مجراي خارجي ادرار) به طرف بالا می باشد. دخترها بیشتر از پسرها به عفونت ادراری مبتلا می شوند.

زیرا پیشابرای در دختران کوتاه تر است و میکروبها راحت تر به داخل مثانه راه می یابند.

### عوامل زمینه ساز:

۱. ریفلaks (پس زدن) ادرار از مثانه به طرف بالا به دلیل اختلالات آناتومیکی یا التهاب مثانه

۲. تخلیه ناکافی مثانه

۳. تاخیر در ختنه نوزاد پسر

۴. مصرف برخی از داروها

۵. بیوست

۶. کرمک

۷. نگه داشتن ادرار

### علایم شایع:

۱. در نوزاد: تب- کاهش وزن - عدم وزن گیری- تهوع واستفراغ- اسهال- و زردی

۲. در کودکان بزرگتر: تکرار ادرار- سوزش و درد حین ادرار کردن- دل درد- بی اختیاری ادراری شب ادراری بدون سابقه فامیلی- ادرار بدبو- عدم رشد- عدم اشتها

در صورت درگیری مجاری فوقانی ادراری علاوه بر علایم گفته شده در صورت درگیری مجاری فوقانی ادراری علاجم زیر نیز دیده می شود:

تب و لرز- درد پهلوها - هماچوری(وجود خون در ادرار)

با مشاهده علایمی همچون تب و یا جیغ کشیدن بچه به هنگام ادرار کردن (اگر نوزاد می باشد) و بیقراری حتماً شک در عفونت ادراری کرده و فوراً به پزشک مراجعه نمایید.

**تشخیص:** ۱. کشت ادرار با استفاده از روش های مختلف از جمله کیسه ادراری، سونداز، نمونه وسط ادرار

۲. تجزیه ادرار یعنی بررسی وجود باکتری در ادرار، وجود گلbul سفید در ادرار و ...

۳. استفاده از روش های تشخیصی نظیر: سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری و سی تی اسکن کلیه و پیلوگرافی و ریدی

**درمان:** درمان بیماری با آنتی بیوتیک های مناسب انجام می شود. نوع آنتی بیوتیک بر اساس نتیجه و پاسخ کشتن ادرار است.