

داروی اُکسالی پلاتین عوارض و مراقبت ها

گروه هدف: بیمار و خانواده



- ✓ از مصرف تیغ و دهانشویه های تجاری پرهیزید.
- ✓ طی درمان ممکن است موها ریزش پیدا کنند و لازم است بیمار آمادگی این عارضه را داشته باشد.
- ✓ طی درمان با این دارو واکسیناسیون نباید انجام شود.
- ✓ طی درمان و تا ۴ ماه بعد از درمان از روش های بارداری استفاده کنید. این دارو می تواند سبب نازایی شود.
- ✓ هرگونه تغییر در تنفس و یا سرفه مداوم نیز باید گزارش شود.

منبع:

داروهای ژنریک. دکتر مرجان رسولی ۱۳۹۶

- ✓ قبل و حین درمان و پس از آن ماهانه تست های کبدی (بیلی روبین، AST، ALT، LDH) را کنترل کنید.
- ✓ هر تغییری بر روی بدن بیمار مثل خونریزی، کبودی، خارش و زردی پوست گزارش شود.
- ✓ ورم در پاها، درد مفاصل، درد شکم، لرز، ادرار تیره و مدفوع روشن به اطلاع پزشک رسانده شود.



تهیه کنندگان: گروه آموزش به بیمار مرکز

با تأیید: دکتر افشین رخشا (دانشیار - متخصص رادیوتراپی و انکولوژی)

بازبینی بهار ۱۴۰۳ - بازبینی مجدد ۵ سال بعد

اکسالیپلاتین

این دارو با نام دیگر الوکساتین نیز شناخته می شود. یک داروی شیمی درمانی است که در درمان سرطان روده بزرگ و مری و سرطان تخمدان کاربرد دارد و بیشتر در موارد پیشرفته این سرطان ها استفاده می شود.

راه تجویز این دارو وریدی است.



عوارض

عوارض شایع آن شامل:

- ✓ خواب رفتگی
- ✓ احساس خستگی
- ✓ تهوع
- ✓ استفراغ
- ✓ کاهش گلبول های خون
- ✓ و عوارض جدی تر آن بروز واکنش های حساسیتی است.
- ✓ مصرف این دارو در دوران بارداری ممکن است به جنین صدمه بزند.



مراقبت ها

- ✓ به طور هفتگی آزمایش شمارش گلبول های خونی و پلاکتی انجام داده شود و در صورتی که گلبول های سفید (WBC) کمتر از ۴۰۰۰ یا تعداد پلاکت کمتر از ۱۰۰ هزار شد دارو را قطع کرده و به پزشک اطلاع دهید.
- ✓ در صورت بروز وزوز در گوش ها، افزایش ضربان قلب، تورم صورت و غش دارو را قطع کرده و به پزشک اطلاع دهید.
- ✓ درجه حرارت را هر ۴ ساعت کنترل کنید، افزایش آن می تواند دلالت بر شروع عفونت باشد.
- ✓ در صورت علائم شبیه تنگی نفس، طپش قلب و قرمزی پوست در محل تزریق در زمان انفوزیون دارو سریعاً به پرستار اطلاع داده شود.