

عفونت در خون (سپسیس) نوزاد

در دوران بارداری یا زایمان ، عفونت ممکن است از مادر از طریق جفت به نوزاد و یا از طریق کانال تولد منتقل شود. اگر در طول دوره بارداری کیسه اطراف جنین نشت بر دارد ممکن است نوزاد مبتلا به عفونت شود.

پس از به دنیا آمدن ، کودک همچنین می تواند مبتلا به عفونت شود و رعایت بهداشت ضروری است. سیستم ایمنی نوزاد هنوز کارایی کافی را برای مبارزه با عفونت ندارد. پس از بدنیا آمدن نوزاد ، ممکن است عفونت را از طریق محیط یا دستها یا وسایل آلوده یا هوای آلوده کسب کند.

مراقبت در منزل:

- اگر در زمان مراقبت از نوزاد مبتلا به سرماخوردگی و یا عفونت ریه می باشید، ماسک بزنید و یا این که مراقبت از نوزاد را به فرد قابل اعتماد دیگری واگذار کنید.
- از بردن نوزاد در مکان های شلوغ و پرازدحام خودداری کنید.
- از تماس نوزاد با افراد مبتلا به بیماری های عفونی و سرما خورده جلوگیری شود
- اگر شما یا فرد دیگری در منزل سیگار می کشد زمان آن رسیده است تا سیگار را ترک کنید.
- مهمترین عامل کنترل عفونت شستشوی مرتب دست به روش صحیح می باشد پس قبل و بعد از تماس با نوزاد دست های خود را بشویید و اگر فرد دیگری مراقبت از نوزاد را بر عهده دارد این اقدام را به او گوشزد کنید.
- مرتب به نوزاد خود شیر بدهید.
- در صورت تجویز دارو در منزل آن را سر ساعت به نوزاد بدهید و از قطع دارو بدون اجازه پزشک خودداری کنید.
- در فواصل منظم و مشخص جهت پی گیری درمان به پزشک مراجعه کنید.

در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان مراجعه کنید و با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت مشاهده علائم زیر به بیمارستان مراجعه کنید:

- اگر نوزاد ، بعد از روز چهارم کمتر از 6 کهنه خیس در روز دارد.
- اگر نوزاد ، بعد از روز چهارم عمر کمتر از 4 دفع مدفوع دارد و مدفوع هنوز رنگ سبز دارد و زرد یا قهوه ای نشده است.
- اگر نوزاد زردی دارد.
- اگر نوزاد کبود می شود یا اختلال هوشیاری دارد یا کم رنگ یا بیرنگ شده است.
- عدم اشتها به شیر یا استفراغ مکرر
- نوزاد کمتر از 8 بار در 24 ساعت یا نصف مقدار معمول شیر می خورد و بی حال یا خواب آلود است.
- اگر بند ناف قرمز و متورم شد یا ترشح خونی یا چرکی داشت باید نوزاد را فوری نزد پزشک برد.
- بیقراری نوزاد

تأیید: دکتر شیرین محمدی (فوق تخصص اطفال)

بازبینی بهار 1403-بازبینی مجدد 1407